

ВНИМАНИЕ! ОТИТ!

СРЕДНИЙ ОТИТ – это воспаление среднего уха (полость между барабанной перепонкой и внутренним ухом).

КРИСТИНА, мама Юли (1 год 8 мес.)

«Утром в воскресенье мы планировали провести день в парке, но внезапно Юляша стала плакать, капризничать, потягивать ушко. У нее поднялась температура. Дочка плакала и жаловалась: «Ушко больно!» Мы пролечились, но через полгода все повторилось снова, и было гнойное отделяемое из ушка... Всего у дочки было четыре случая обострения, а сейчас у нее ухудшился слух».



НАСКОЛЬКО ОПАСНЫ ИНФЕКЦИИ СРЕДНЕГО УХА?^{1,2}

- ➔ Инфекции среднего уха у детей младшего возраста встречаются чрезвычайно часто. На первом году жизни до 80% детей хотя бы один раз болеют средним отитом, а у 40% отмечается два-три рецидива заболевания.¹
- ➔ Тяжелое, часто повторяющееся гнойное воспаление среднего уха может привести к перфорации барабанной перепонки, что вызывает снижение слуха вплоть до полной его потери!
- ➔ 55% острых средних отитов у детей обусловлены пневмококком.

Распространение пневмококка от человека к человеку происходит преимущественно воздушно-капельным путем при кашле или чихании, а также при контакте с предметами (контактный путь), которые соприкасались со слюной (ложки, чашки, игрушки и т.п.). Опасность заболеть существует круглогодично!²



ПРЕДОТВРАТИТЕ ОТИТ У ВАШЕГО МАЛЫША – СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ ОТ ПНЕВМОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ!*



СХЕМЫ ВАКЦИНАЦИИ ОТ ПНЕВМОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА МАЛЫША:

Если Вашему малышу 2 месяца:³

двукратная вакцинация: в 2 месяца и в 4,5 месяца. Третью дозу (т.е. ревакцинацию) рекомендуется вводить на втором году жизни в 15 месяцев.

Если по какой-то причине Вы пропустили плановые прививки, рекомендуются следующие схемы:

Если Вашему малышу от 3-х до 11 месяцев:

двукратная вакцинация с интервалом не менее месяца между введениями. Третья доза (т.е. ревакцинация) рекомендуется на втором году жизни, не ранее чем через 2 месяца после введения второй дозы.

Если Вашему малышу от 12 до 23 месяцев:

двукратная вакцинация с интервалом между введениями не менее 2-х месяцев.

Если Вашему малышу от 2-х до 5 лет (включительно):
проконсультируйтесь с врачом.

*снижение частоты развития тяжелых острых средних отитов любой этиологии до 60%⁴

Литература:

1. Н.А. Маянский, Н.М. Алябьева, А.М. Иваненко, О.А. Пономаренко, Л.К. Катосова, А.В. Лазарева, Т.В. Куличенко, Л.С. Намазова-Баранова. Бактериальная этиология острого среднего отита у детей до 5 лет: роль *Streptococcus pneumoniae*. Вопросы диагностики в педиатрии. 2013; 3(5), 5-13.
2. МР 3.3.1.0027-11 «Эпидемиология и вакцинопрофилактика инфекции, вызываемой *Streptococcus pneumoniae*»
3. Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям: Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 21 марта 2014 г. № 125н.
4. Ben-Shimol S, Givon-Lavi N, Leibovitz E, Raiz S, Greenberg D, Dagan R. Near-elimination of otitis media caused by 13-valent pneumococcal conjugate vaccine (PCV) serotypes in southern Israel shortly after sequential introduction of 7-valent/13-valent PCV. Clin Infect Dis. 2014 Dec 15;59(12):1724-32.