

Внимание! Корь!

Корь – острое инфекционное вирусное заболевание, которое характеризуется

- общей интоксикацией
- повышением температуры тела (до 39–40°С)
- этапным появлением нисходящей сыпи на теле (в течение 3–4 дней)
- конъюнктивитом
- поражением верхних дыхательных путей
- навязчивым, грубым, «лающим» кашлем

Почему корь так опасна?

Тяжелое течение обусловлено развитием осложнений, наиболее часто отмечающихся у детей грудного возраста и взрослых

Как возможно заразиться?

Вирус выделяется во внешнюю среду в большом количестве со слизью во время кашля, чихания (за 3–4 дня до начала заболевания и в первые 4 дня появления сыпи)

Осложнения кори

- Частые осложнения – пневмония, трахеобронхит, отит, гнойные заболевания дыхательных путей
- Наиболее опасные – энцефалит, менингоэнцефалит
- Подострый склерозирующий панэнцефалит – редкое, но грозное осложнение кори (болеют дети, перенесшие корь в возрасте до 2 лет), развивается через несколько лет после заболевания, приводит к смерти на фоне неуклонного снижения интеллекта и двигательных расстройств

Самое эффективное средство профилактики кори – вакцинация!
Корь чрезвычайно заразна: один заболевший в среднем может заразить до 18 человек!



Профилактика кори

Все дети, не имеющие медицинских противопоказаний, вакцинируются в возрасте 1 года; в 6 лет проводится ревакцинация

Используются следующие вакцины

- Живая коревая вакцина (ЖКВ)
- Комбинированная живая паротитно-коревая вакцина (ЖПКВ)
- Комбинированная тривакцина, содержащая коревой, паротитный и краснушный компоненты

Вакцинация взрослого населения против кори проводится двукратно (с интервалом не менее 3-х месяцев) живой коревой моновакциной

- Всем ранее не привитым, не болевшим или не имеющим документального подтверждения о вакцинации в возрасте с 18 до 35 лет
- Представителям отдельных профессий в возрасте до 55 лет, ранее не привитым, не болевшим или не имеющим документального подтверждения о вакцинации
 - Работникам медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы
 - Работникам, которые трудятся вахтовым методом
 - Сотрудникам государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу



В очаге кори все непривитые лица подлежат экстренной иммунопрофилактике с использованием живой коревой вакцины в первые 72 часа

